



Acidente de risco para transmissão de HIV, HBV e HCV

Profissional contaminado com HEPATITE B (HBV)

Profissional contaminado com HEPATITE C (HCV)

Profissional acidentado com HIV.

Vacinado para HB 3 doses

Apenas 1 ou 2 doses

Não vacinado para HB

Realizar teste ANTI-HCV.

Teste rápido para HIV no profissional contaminado

Nada a fazer (protegido)

Tomar IGHAHB e completar o esquema vacinal da HB.

Tomar IGHAHB + as três doses da vacina HB a primeira dose no momento, segunda dose depois de trinta dias e a terceira dose depois de seis meses.

Vacinado as 3 doses para HB, nada a fazer (protegido)

Não vacinado: receber as vacinas para hepatite B, vacina contra gripe (anualmente), vacina contra pneumonia.

Reagente

Iniciar PEP

Zidovudina (AZT) - 300 mg 2x/dia ou 200 mg 3x/dia  
Lmivudina (3TC) - 150 mg 2x/dia  
Obs: sempre associar os dois medicamentos.

Exames: hemograma completo, dosagem transaminase hepáticas, pesquisa de uréia e creatinina séricas.

2 semanas após o PEP repetir os exames.

Anti- HIV, Elisa (no momento do acidente, após 6 semanas, 3º mês e 6º mês após a exposição)